


- peu de réactions
- je prends le misoprostol même si j'ai déjà saigné

- début des saignements en 4 à 6h dans 60% des cas, et en 1 à 3 jours sinon
- Saignements plus abondants que des règles et avec caillots de sang, parfois expulsion de la poche : pensez à anticiper si vous ne voulez rien voir
- Douleurs comme des règles voir plus fortes
- Possible : nausées, vomissements, diarrhée, frissons, fièvre, maux de tête, malaises

Les réactions aux médicaments sont très variables.



Misoprostol & antidouleurs

- ① Izalgi / tramadol / codoliprane __ cp + antivomifit

: 30min

- ② Ibuprofène __ cp

③ Misoprostol __ cp à faire fondre entre la gencive et la joue

- ④ En cas de douleurs :

Acupan __ cp

: 4h { Ibuprofène 2 cp puis stop 24h Izalgi / tramadol __ cp

: 6h Codoliprane __ cp

Je consulte si :

- 30min ... 2h
- ou → $\geq 38^\circ\text{C}$
- malgré ... 4h

Urgences



Rdv pose implant / DIU
Jour xx / xx
— h —

Test β-hCG

Il sera toujours positif, on regarde que ça diminue !

Jour xx / xx



RDV de contrôle

Visio // Présentiel

Jour xx / xx

— h —

